

Bactra


5 arter i Nordeuropa, alle tilknyttet
vådområder

Bactra robustana (Christoph)



16-22 mm. Hunnen bliver normalt større end hannen. Arten er ikke specielt flyvelysten i dagtimerne men kan let rystes ud af foderplanterne. Den kommer fint til lys, somme tider i større tal. Den er fremme fra juni til august.

Bactra robustana (Christoph)



Der er temmelig stor farvevariation og lyse hunner kan ligne *lancealana* en hel del. Men de kan kendes på størrelsen. På nogle eksemplarer er der et tydeligt, næsten sort, "u" eller "v" som sammen med de lidt bredere vinger og den meget mørkebrune grundfarve normalt gør også hannerne kendelige.

DANIA, SJ, MF89
Kogsbøl Mose
18.7.2013 E.Palm

Bactra robustana (Christoph)



Larven er monophag på *Scirpus maritimus* (Strand-Kogleaks). Den lever overvintrende i stænglen og roden og pupper samme sted.

På mange eksemplarer er der et tydeligt, næsten sort, "u" eller "v" som sammen med størrelsen og de lidt bredere vinger gør i hvert fald hannerne let kendelige.

Dania NWJ:
Oddesund Nord
16.6.1978 E.Palm


Bactra robustana (Christoph)



I Danmark er arten fundet i alle distrikter, men den er noget lokal og det er ikke alle steder den er lige almindelig. I marskområder og langs søbredder kan der lokalt være mange. Kendt fra hele Europa, Nordafrika og mod øst helt til Japan.

Dania: SJ, MF79
Vestermærk
2.7.2015 E.Palm


Bactra lancealana (Hb.)



13-19 mm. Begge køn varierer en hel del. Arten flyver allerede sidst i maj og bliver ved hele sommeren til september i to overlappende generationer. Imago flyver - Jels e.la. 6.3.2017, eller kan bankes ud - af vegetationen fra sidst på efterkl. 4.4.2017 E.Palm middagen. Den kommer også fint til lys.




Bactra lancealana (Hb.)



Hunnen er mere spidsvinget med slankere vinger end hannen, og i øvrigt meget variabel. Ofte er vingen mere eller mindre tvefarvet med lysere forkant. Larven er oligofag på sumpplanter: *Juncus*, *Scirpus*, *Carex* m. v. Den lever overvintrende i rødderne og kan let klækkes hvis man tager rødder ind.

**Dania WJ:Stou-
bæk Krat/Hodsager
1.7.1980 E.Palm**

Bactra lancealana (Hb.)



DANIA, SJ, NF18
Tinglev Mose
9.6.2013 E.Palm

Også hannerne er meget variable, men de har næsten altid et "V" eller "U" som af og til kan stå helt sort og kontrastrigt på den gulbrune baggrund. Oftest er mærket dog lysere. Skyggen mod apex er "knækket".



Bactra lancealana (Hb.)



Bemærk: billederne af lancealana i "Die Tortriciden Mitteleuropas" tilhører lacteana.



I Danmark er *lancealana* almindelig eller meget almindelig overalt på egnede steder. Visse steder kan den optræde meget talrigt. I Europa går arten højt mod nord og udbredelsen når Nordafrika og Kina. Også kendt fra USA og Canada.

Dania: NEJ, N.134
Rødhus Klt
24.6.2019 E.Palm

Bactra lancealana, lacteana og suedana



B. lancealana



Disse 3 arter kan være meget svære at kende fra hinanden. *B. lancealana* har enten et "knæk" på skyggen i vingespidsen eller skyggen er meget utydelig, af og til manglende. De

to andre arter har en tydelig skygge der oftest går næsten ret ud i vingespidsen, ofte et par (eller flere) parallelle mørke striber før apex (som *lancealana* ikke

har) og farven er lidt anderledes. *B. lacteana* er svagt rødlig mens *suedana* er lysere, mere strågul med flere længere, mørke striber. *B. lancealana* er lidt grovere tegnet.



B. lacteana han øverst, hun nederst



B. suedana han

Bactra lacteana (Caradja)



12-18 mm. Hunnen bliver størst, men arten er en anelse mindre end de øvrige. Imago flyver sidst på dagen og kan lokalt findes i større antal omkring foderplanten. Den kommer også af og til til lys. De fine sorte streger før apex kan være ganske svage, men forekommer ikke hos *lancealana*

Dania B.Olsker
26.6.1973 E.Palm

Bactra lacteana (Caradja)



DANIA, SJ, MG91 • Genitalierne er næsten identiske med *furfurana* og
Lindet Skov arten er først sent opfattet rigtigt her i Danmark
16.6.2016 E.Palm

Bactra lacteana (Caradja)



Larven er ukendt, men lever givetvis som de øvrige, overvintrende i stængel og rod, på sumplanter. Jeg har fundet arten i stort antal omkring Sumpstrå (*Elocharis*) som formentlig er artens hoved-foderplante. Svensson foreslår Almindelig Star (*Carex nigra*) som arten også er set flyve omkring i Danmark.

Dania NWZ:Tuse
Næs/Udby Enge
6.7.1981 E.Palm


Bactra lacteana (Caradja)



Dania SJ:
Kiskelund
24.6.1981E.Palm

Hunnen er, som hos de øvrige arter, mere spidsvinget og ofte tvefarvet med lysere forkant, men i øvrigt variabel, men næsten altid med en rødlig tone, specielt i frynserne.

Bactra lacteana (Caradja)



Temmelig spredt forekomst i Danmark. Flest findesteder er der på Bornholm, på Lolland-Falster og det nordlige Jylland. Arten er i reglen sjælden og enkeltvis forekommende, men lokalt kan den være ganske talrig. I Norden forekommer den langs Norges vestkyst, gennem Syd- og Mellemsverige og den sydlige halvdel af Finland og i Baltikum. I Europa, Sibirien og Kina.


Bactra suedana Bengtsson



**Dania NWZ: Føl-
lenslev 25.7.2006
E. Palm leg.**

15-19 mm. Hunnen er størst. Imago flyver sidst på eftermiddagen på fugtige enge fra midt i juni til midt i august (sidst i august i Sverige) og kommer også enkeltvis på lys. Kendelig på den lyse, let skinnende grundfarve og de mørke streger i skråstregen fra rod mod vingespid.

Bactra suedana Bengtsson



Hunnen er ikke helt så spids- og smalvinget som hos de øvrige arter. Larven er ukendt, men Svensson oplyser, at en Star (*Carex appropinquata*) vokser på levestederne. I Danmark nævnes, at arten er fundet omkring siv (*Juncus*) i Risby og Almindelig Star (*Carex nigra*) ved V. Egesborg.

**Dania NWZ: Føl-
lenslev 7.7.2006
E. Palm leg.**


Bactra suedana Bengtsson



Arten er først erkendt og beskrevet i 1989. Mærkværdig er manglen på ældre eksemplarer i samlingerne. I årene omkring opdagelsen blev arten fundet flere forskellige steder, også fastboende, men i de senere år ser det ud som om den igen er på retur, selv om enkelte eksemplarer stadig dukker op.


Dania SJ:Als
Nørreskov
25.6.1981 E.Palm

Bactra suedana Bengtsson



- Arten er stadig dårlig kendt. I Skandinavien er den fundet i det sydligste Sverige (Skåne, Öland og Gotland) Ålandsøerne og det sydøstligste Finland. Desuden i alle de baltiske lande og Belgien.
- Det ældste danske eksemplar er fra NEZ: Risby 1979 (G. Jeppesen). Arten er sjælden i Danmark og i flere distrikter foreligger kun enkeltfund. Kun i SZ: Vester Egesborg, NWZ: Hegninge og Hallenslev Moser og i NEZ: Risby er arten fundet i lidt større antal, ellers drejer det sig mest om enkeltfund. I LFM er der dog en hel del findesteder. I Jylland kendes arten kun i enkeltfund fra det østlige EJ og SJ og fra Bornholm kun fra Ølene.

Bactra furfurana (Hw.)



Dania: SJ, MF79
Vestermærk,
Sdr Sejerslev
14.8.2019 E.Palm

12-19 mm. Hunnen bliver størst. Imago flyver sidst på dagen fra juni til august, somme tider i stort tal omkring foderplanten. To generationer. Om natten kommer den til lys. Den hører til i fugtige områder, oftest nær kysten. Der er en hel del variation i farvetonen.

Bactra furfurana (Hw.)



Dania: SJ, MF89
Sdr. Sejerslev
19.6.2019 E.Palm

Larven lever overvintrende fra august til maj i stænglerne af Sumpstrå (*Elocharis*) i Skandinavien. I øvrigt nævnes Siv (*Juncus*) - og Kogleaks (*Scirpus*) -arter fra andre dele af Europa.


Bactra furfurana (Hw.)

Dania: SJ, MF89
Sdr. Sejerslev
19.6.2019 E.Palm



- Arten er i Danmark fundet spredt i det meste af landet, men kun på Bornholm, Lolland-Falster og langs Jyllands vestkyst er arten ret almindelig. I det øvrige Danmark er den sjælden og mest fundet enkeltvist. I Skandinavien går den op langs Oslofjorden og et enkelt sted inde i fjeldene i Norge, i det meste af Sverige undtagen helt mod nord, den sydlige halvdel af Finland og Baltikum. Holarktisk. I Palæarktis til Himalaya og Japan.

Bactra venosana (Z.)



16-20 mm. Hunnen er størst. Imago er nataktiv og kommer fint til lys. Den findes i to generationer fra april-maj og igen juli-september. Arten hører hjemme i fugtige områder. Larven lever i stænglerne af Fladaks (*Cyperus*) og Tagrør (*Phragmites*). I Sydeuropa behøver den ingen diapause og kan producere generationer året rundt.

Bactra venosana (Z.)



Arten er udbredt i det sydlige Middelhavsområde. Der nævnes bl. a. Spanien. Mine eksemplarer er fra Sydvestfrankrig. Den kendes også fra Afrika, Kina, Australien og Hawaii m. v.

France (64)
Aquitaine, Louer
18.8.2007 E.Palm