

Enarmoniini (Ancylys)

A. albersana, E. formosana og
Ancylys-arterne (140 beskrevne arter
indtil videre). 23 arter i Nordeuropa

Eucosmomorpha albersana (Hb.)



DANIA, SJ, MG92
Fårmandsbjerg
5.6.2013 E.Palm

12-15 mm. Imago flyver sidst på eftermiddagen omkring foderplanten i maj-juni og kommer ind i mellem også til lys. Den hører til i lyse skove – gerne fyrre- eller egeskove - eller skovbryn.

Eucosmomorpha albersana (Hb.)



Dania: NEJ, NJ94
Lyngså Sønderklit
18.5.2014 E.Palm

Der er ikke megen variation. Hunnen har mørke bagvinger. Larven lever i august-september i sammenspundne blade af Gedeblad (*Lonicera*). Den skal også kunne leve på Snebær (*Symphoricarpos*).

Eucosmomorpha albersana (Hb.)



I Danmark er arten ret almindelig i det meste af landet. Der er dog temmelig langt mellem findestederne i det vestlige og sydlige Jylland og arten er sjældent talrig. I Skandinavien går nordgrænsen gennem det sydligste Norge, det sydlige og sydøstlige Sverige og det sydlige Finland. Desuden Baltikum, hele Europa og helt til Fjernøsten.

DANIA, SJ; MF79
Tingdal Plt.
27.5.2017 E.Palm



Enarmonia formosana (Scop.)



13-18 mm. Imago flyver også i dagtimerne fra juni til august, men kommer sjældent til lys. Den hører til i haver og parker, men også i skove, hvor foderplanten vokser

Dania NWZ:
Føllenslev
3.6.1977 E.Palm



Enarmonia formosana (Scop.)




Larven lever fra august til maj under bark af forskellige frugttræer, specielt Æble (*Malus*) i Danmark, men også Pære (*Pyrus*), adskillige *Prunus*-arter og Kirsebær (*Cerasus*), hvor træet er lidt skadet. Der er ikke så megen variation.

Dania NWZ:
Særslev
1.6.1982 E.Palm



Enarmonia formosana (Scop.)



I Danmark er *formosana* temmelig enkeltvist forekommende og tydelig bundet til enkelttræer, f. eks. et skadet kirsebærtræ. Hovedudbredelsen er mod øst, men der er også enkeltfund mod vest i NWJ:Lemvig, WJ:Oksby og Fanø og SJ: Sdr. Sejerslev og Vestermark, Sdr. Sejerslev. Nordgrænsen går gennem det sydlige Norge, det sydlige og østlige Sverige, helt op til den Botniske Bugt og den sydlige halvdel af Finland. Desuden Baltikum. Mod syd til Nordafrika og mod øst til Japan. Indslæbt i Canada.

Ancylis unguicella (L.)



Dania NEZ:
Asserbo
12.5.1971 E.Palm

13-18 mm. Imago flyver både formiddag og eftermiddag-aften over lynghederne fra først i maj til midt i juni. I bjergområder kan den findes også i juli.

Ancylis unguicella (L.)



Dania WJ :MG56
Bordrup Klitplt.
8.5.2013 E.Palm



France (73) Savoie
Col de la Croix de
Fer 2046 m.o.h.
1.7.2016 E.Palm

Arten er temmelig variabel men kendelig på den mørke spids i mellemfeltet, som ingen af de lignende arter har.

Arten er knyttet til heder og larven lever overvintrende på Hede-Lyng (*Calluna*). Også Klokkelyng (*Erica*) angives. Arten fortsætter med at æde i foråret.

Ancylis unguicella (L.)




Dania NWZ:Eske-
bjerg Vesterlyng
10.6.1977 E.Palm

Hunnen er mere kortvinget og kontrastrig end hannen.



Ancylis unguicella (L.)



I Danmark kan arten være lokalt talrig på lyngheder, på Øerne dog mest langs kysten og det er ikke alle steder den optræder. I alle de sydlige dele af landet er den sjælden, på Fyn kun kendt i gamle fund, i LFM kun Bøtø og Horreby Lyng. I SJ kun helt mod nord og i SZ kun Li. Torøje fra nyere tid. Udbredt i hele Skandinavien til Ishavet. Holarktisk. I Tyskland kun gamle fund i Schlesvig-Holstein og Niedersachsen. Europa og mod øst til Japan.

Ancylis unguicella og uncella



Ancylis unguicella han øverst, hun i midten og *A. uncella* nederst.

Begge de spraglede arter har et mørkt midtbånd som er trukket ud i en spids i midten, men båndets afgrænsning mod vingeroden er forskelligt, hos de to. Hos *A. unguicella* er det lyst afgrænset i hele båndets længde, mens det kun er afgrænset tilsvarende langs kant og rand hos *uncella*, og det store midterparti har samme farve som båndet indad næsten til vingeroden. Spejlet er uroligt tegnet og ikke skarpt afsat hos *unguicella*, mens det fremstår ret ensfarvet gråt og tydeligt hos *uncella*.

Ancylis uncella (D. & S.)



Dania: WJ, MG47
Bordrup Klitpl.
25.4.2014 E.Palm

15-20 mm. Imago flyver eller kan jages op i dagtimerne, men flyver mere villigt hen mod aften fra midt i maj til midt i juni og i bjergegne helt til midten af juli. Den kommer også af og til til lys. Den hører til på heder og overdrev med Birk, gerne steder hvor der er opvækst med enkeltstående træer.


Ancylis uncella (D. & S.)



Dania NWZ:Rørvig
Amtsplantage
15.6.1983 E.Palm


Larven lever overvintrende mellem spundne blade af Birk (*Betula*) fra sidst i juli til april og æder også om foråret. Den er også noteret fra Klokkelyng (*Erica*).

Ancylis uncella (D. & S.)



- I Danmark er arten ret enkeltvist forekommende. Hyppigheden aftager tydeligt mod syd, og i den sydlige halvdel af landet er arten sjælden, måske bortset fra Bornholm. På Fyn kun i Snarup og Brændegårds moser, og i SZ kun omkring Holmegårds Mose. Udbredelsen i Skandinavien når næsten til Ishavet og arten er almindelig. I Europa i øvrigt mangler den i sydvest, men forekommer videre helt til Japan mod øst.

Ancylis laetana (F.)



DANIA, SJ, MF99
Draved Skov
21.5.2012 E.Palm

13-18 mm. Imago flyver eller kan bankes ud formiddag og eftermiddag, men der mest aktiv sidst på dagen. Den er fremme i maj-juni. Arten hører til i Bævreaspbevoksninger, både i skove og på heder. Den hviler på stammerne. En sjælden gang dukker den op på lyset.

Ancylis laetana (F.)



Larven lever fra september mellem to blade eller et ombøjjet blad af Bævreasp (*Populus tremula*) og æder igen efter overvintringen i april-maj. Hvis man holder larverne indendørs kan de en sjælden gang klække allerede om efteråret.

DANIA, SJ, MF99
Elium a.la.29.8.2017
KI 12.10.17 E.Palm
Populus tremula

Ancylis laetana (F.)



I Danmark er arten almindelig, hvor foderplanten forekommer. Nordgrænsen går et sted i Mellemskandinavien. I Norge forekommer arten også længere mod nord langs vestkysten. Europa. Mod øst til Kina.

Dania: SJ, MF99
Ellum Mark
19.5.2019 E.Palm

Ancylis kenneli Kuznesov



12-15 mm. Imago flyver sidst på dagen fra sidst i maj gennem juni på fugtige enge. Larven lever formentlig på Mjødurt (*Filipendula ulmaria*). I Skandinavien kun kendt fra det sydligste Finland. For nylig i Sverige (første fund i 2007 i Lydinge i Uppland, hvor arten er fast, men meget sjælden) og Baltikum. Mod øst til Kina og Japan.

FINLAND
U. Inkoo Elisaari
01-14.06.2002
J. Junnilainen leg.

Ancylis upupana (Tr.)



14-20 mm. Imago flyver sidst på dagen og om aftenen omkring toppene af Birk fra begyndelsen af juni. Den er lettest af finde, hvor birkene ikke er alt for høje. Af og til kommer den også til lys.

Dania NWZ:
Ellinge Lyng
7.6.1970 E.Palm




Ancylis upupana (Tr.)



Larven lever i august-september mellem sammen-spundne blade af Birk (*Betula*). Den overvintrer i sidste hudskifte og æder igen om foråret. I Sverige nævnes kun Elm (*Ulmus*) som foderplante. Der er ikke megen variation.

Dania SJ :MF79
Tingdal PIt.
30.5.2013 E.Palm


Ancylis upupana (Tr.)



I Danmark optræder *upupana* oftest sjælden og enkeltvist, men den er på flere lokaliteter truffet i lidt større antal, bl. a. på Bornholm, flere steder i det nordlige Sjælland og også i det nordlige og østlige Jylland (vestligst i Undalslund) og i Tingdal Plantage i SJ. I NWJ kun i Østerild Plt. I Skandinavien findes arten kun i det allersydpøstligste Norge, langs kysterne i de sydlige dele af Sverige (den rapporteres ikke hvert år) og det sydlige Finland. Desuden i Baltikum. Europa og mod øst til Fjernøsten og Japan.

Ancylis obtusana (Hw.)

5061



10-13 mm. Imago flyver om eftermiddagen/aftenen omkring foderplanten fra sidst i maj til midt i juni. Den holder til i lyse skove.

Dania LFM: Bøtø
31.5.1980 E.Palm


Ancylis obtusana (Hw.)



Larven lever på Vrietorn (*Rhamnus*) og Tørst (*Frangula*). I Danmark er den dog først og fremmest fundet på Brombær (*Rubus fruticosus*) fra september. Larven er fundet i Danmark i oktober. Den overvintrer som fuldvoksen. Der er ikke megen variation.



Dania: EJ, NH85
Stenbjergholt
30.5.2019 E.Palm

Ancylis obtusana (Hw.)



I Danmark er arten sjælden og lokal og mest enkeltvist forekommende. Nordgrænsen går gennem Danmark (Vester Lovnkær og Stenbjergholt (Løvenholm Skov)), LFM, B, Sverige (kun Skåne, Småland (2016) og Öland) og det sydligste Finland og Baltikum. I hele det nordlige Tyskland kun kendt fra et ældre fund i Niedersachsen. Desuden fra Vest- og Mellemeuropa til Japan.

Ancylis obtusana, mitterbacheriana og paludana



Ancylis obtusana øverst, *A. mitterbacheriana* i midten og *A. paludana* nederst. Alle 3 arter er rødlige i grundfarven.

A. mitterbacheriana har næsten ingen spejl og midtlinjen går næsten vinkelret op gennem nederste halvdel af vingen. Hos de to andre løber den skråt ind mod vingeroden og fortsætter næsten i hele vingens bredde, hos *paludana* drejer den endda indad og danner et tofarvet rodelt. *A. obtusana* har et gråsort spejl, mens det hos *paludana* er lysegråt eller gulliggråt.

Ancylis comptana (Fröl.)



10-13 mm. I det nordlige Skandinavien flyver en større form (op til 14 mm). *A. comptana* er den mindste af arterne og som regel kendelig på størrelsen alene. Imago flyver sidst på dagen og kommer fint til lys. To generationer mod syd, en mod nord; fra midt i maj til først i august. Den holder til på åbent land; Svensson nævner åbne enge med muldebær. Den går fint op i bjergene og kommer også til lys.

Ancylis comptana (Fröl.)




Fundet i det meste af Skandinavien undtagen Danmark og de vestlige dele af Norge. Nogle steder talrig. Holarktisk. Ikke fundet i Schlesvig-Holstein og Niedersachsen i Tyskland. Fra Europa til Japan og også Nordamerika.

France, 05 Hautes
Alpes, St. Pierre d'
Argencon, 780 m.
12.8.2014 E.Palm

Larven lever på Jordbær (*Fragaria*), Potentil (*Potentilla*), og i det nordlige Sverige formentlig Muldebær (*Rubus chamaemorus*). I Mellemeuropa nævnes en række andre lave planter og nogle steder er den et skadedyr. Den er fremme i juli og igen fra september til april. Den overvintrer i sidste hudskifte.

Ancylis geminana (Don.)



14-19 mm. Imago flyver sidst på dagen fra midt i maj gennem juni på fugtige enge og strandenge, hvor den sværmer over pilebuskene. Den kommer også til lys. Den bliver meget hurtigt affløjet.

Dania NEZ:
Karlstrup Strand
11.5.1972 E.Palm

Ancylis geminana (Don.)



Ancylis geminana er ikke så variabel som *subarcuana*. Arten er i Danmark noget enkeltvist forekommende og på Fyn og Lolland-Falster-Møn er der ikke mange fund. Måske er den blevet sjældnere de senere år? I Skandinavien går den højt mod nord, men undgår kystområderne. I Europa og mod øst til Japan

Dania B:
Bastemose
26.6.1975 E.Palm

Ancylis geminana (Don.)



Larven lever i august-september og igen om foråret. Den er i Mellemeuropa tvekuldet, længere mod nord enkuldet med overvintrende larve. Den lever på forskellige Pile-arter (*Salix* sp.). Der nævnes *S. aurita*, *S. repens*, *S. cinerea* og i Sverige *S. myrsinifolia*. *S. repens* skal dog tages med forbehold, for det er *A. subarcuana*s foderplante og der er en del sammenblanding mellem disse arter og genitalierne giver ingen hjælp med artsadskillelsen, hvilket har givet anledning til, at man i Danmark har haft svært ved at godtage, at det faktisk drejer sig om to arter. I dette kompleks er også *A. diminutana*, som heller ikke kan adskilles på genitalierne.

Vråby Plt. 20.7.2018

Ancylis christiandiana Huemer & Wies.


- Arten er beskrevet i 2016 og derfor meget lidt kendt. Den blev opdaget da man barcodede amerikanske og europæiske arter i slægten og hører til *geminana*-gruppen. Arten ligner *geminana* til forveksling, men er mørkere, mere rødbrun (sort). Buerne på den skrå linje er mere udglattede og kantede.
- Den kendes nu fra Østrig, Tyskland og Letland, men er formentlig meget mere udbredt. Den lever formentlig på Pil (*Salix*).
- Se i øvrigt Gilligan, Huemer & Wiesmair 2016, hvori forfatterne gør rede for hele slægten. Billederne er også taget herfra.



Ancylis geminana, christiandiana, diminutana og subarcuana



Ancylis geminana øverst, *A. christiandiana* i midten og *A. diminutana* nederst tv. Th.
A. subarcuana



A. geminana og *A. christiandiana* er de største af arterne. De har altid en tydelig bølgeformet linje, som går fra rod til spids. Hos *geminana* bølger linjen, som den også gør hos stærkt tegnede *subarcuana*, mens den er mere kantet hos *christiandiana* og *diminutana*. Bølgelinjen er næsten ret yderst hos *diminutana*, der også er meget lidt varierende, hvor den hos de øvrige bøjer nedad igen. Hos *subarcuana* er bølgelinjen kun sjældent så kraftig som på billedet, oftest er den utydelig og afbrudt eller manglende. *A. subarcuana* er knyttet til Krybepil, hvor de øvrige arter hører til omkring andre Pile-arter. Der er ingen eller ganske små genitalforskelle mellem arterne. Men barcoding har entydigt vist at det drejer sig om selvstændige arter, som faktisk kan kendes på udseendet i langt de fleste tilfælde.



Ancylis diminutana (Hw.)



11-16 mm. Imago er aktiv sidst på dagen, hvor den flyver over pilebuske fra omkring 1. juni til lidt ind i juli. Længere mod syd er der to generationer. Den kommer også, ganske enkeltvist, til lys. Den holder til i moser og på fugtige enge (gerne i skove), hvor foderplanten gror.

Ancylis diminutana (Hw.)



Larven lever på Pil (*Salix*), men **ikke** *S. repens*. Svensson nævner *S. aurita*, men arten kan også leve på en række andre Pile-arter. Den spinder et par blade sammen til en lille båd i august-september , overvintrer og forpupper i foråret. Arten bliver hurtigt afstøvet.

Dania B: Vang
28.6.1975 E.Palm Der er nogen variation i farven.




Ancylis diminutana (Hw.)



- Ret enkeltvist og sjældent forekommende, i visse år dog i lidt større antal. Den forekommer i hele Danmark. Nordgrænsen går gennem det sydlige Norge (der er dog også enkelte fund langs vestkysten længere mod nord), det mellemsste Sverige og Finland. Desuden Baltikum. Europa. Mod øst til Japan.

Ancylis subarcuana (Douglas)



11-16 mm. Imago flyver om eftermiddagen-aftenen ofte i antal omkring foderplanten i to generationer, hvoraf den første fra ca. 10 maj gennem juni er langt den mest talrige. 2. generation i august. Den ses af og til på lys.

Ancylis subarcuana (Douglas)



Larven lever i bladene på Krybepil (*Salix repens*) i august-september og overvintrer og enkeltvis igen i juni-juli.

DANIA, SJ; MG91
Hønning Plt.
14.5.2017 E.Palm



Ancylis subarcuana (Douglas)



- Arten er meget variabel. Variationen går fra næsten ensfarvet til temmelig stærkt tegnet, som på billedet her, og så kan arten ligne *A. geminana*. Grundfarven er dog grå eller hvidgrå, og ikke meget brun.
- Arten er i Danmark lokalt talrig, hvor der gror Krybepil, d.v.s. overdrev, heder, klitter o.s.v., og specielt langs kysterne i Nordsjælland og Vest- og Nordjylland og på Bornholm kan der være mange. Der er kun et findested på Fyn: Snarup Mose 1925 & 26. Der er heller ikke mange fund i SZ. I Skandinavien går arten højt mod nord, uden dog at nå helt til Ishavet. Hele udbredelsen går fra Storbritannien til Baltikum, hvor den kendes fra alle lande i den nordlige del af Europa. I Tyskland dog kun i gamle fund i de nordligste provinser.

Dania: NEZ:
Melby Overdrev
21.5.2010 E.Palm

Ancylis selenana (Guenée)



11-15 mm. Imago flyver sidst på dagen under tjørnebuskene i fra midt i maj til midt i juni, somme tider lidt senere. Den kommer fint til lys. Den holder til i skovbryn og lyse skove med tjørn. Der er ikke megen variation.


Dania SZ:
Knudskov
15.5.1989 E.Palm

Ancylis selenana (Guenée)




Larven lever mellem to spundne blade af Tjørn (*Crataegus*) i august-september og forpupper uden at æde videre i det tidlige forår. Længere mod syd er der også en ekstra generation i sommermånederne. Andre steder i Europa nævnes også Æble (*Malus*) og Pære (*Pyrus*). I Ukraine og længere mod øst kan den optræde som skadedyr. Her nævnes også *Prunus* sp. og *Cerasus* som foderplanter.

Ancylis selenana (Guenée)



Arten er lokal og sjælden i Danmark og Sverige. I Danmark er udbredelsen begrænset til Sjælland og Lolland-Falster, men måske er arten på retur. I Sverige kun kendt fra de sydligste dele og i Finland kun i den sydligste tredjedel af landet. Den er kendt fra alle lande i Baltikum. I Nordtyskland er der kun et gammelt fund fra Schlesvig-Holstein. Arten er udbredt i Europa og videre mod øst til Japan.

Ancylis unculana (Hw.)



13-17 mm. Imago flyver om eftermiddagen/aftenen omkring foderplanten og kommer også lejlighedsvis til lys. Den er fremme fra de sidste dage af maj gennem juni og lidt ind i juli. Den hører til i lyse skove, på heder og moser og langs skovbryn hvor foderplanten vokser. Der er ikke megen variation.

Dania EJ:
Hvidding Krat
31.5.1974 E.Palm



Ancylis unculana (Hw.)



DANIA, SJ, MG90
Råbjerg Plt.
1.6.2016 E.Palm

Larven lever mellem spundne blade af Vrietorn (*Rhamnus*) i august-september. Den overvintrer og forpupper sig i maj. Længere mod syd i Europa er der også en generation i august. Også Tørst (*Frangula*) er foderplante og i Europa også en række andre træer.



Ancylis unculana (Hw.)



Dania NEJ: Somme steder er arten ganske hyppig, andre steder mere enkeltvis, nok
Tversted Plt. almindeligst i Jylland, men kendt fra hele landet. Arten når op til det sydligste
16.6.1982 E.Palm Norge, langs Oslofjorden, det sydlige Sverige og Finland og Balticum. Hele Europa
og mod øst til Japan.

Ancylis unculana, myrtillana, badiana paludana og kennelli





A. unculana ø.,
myrtillana han i
midten og hun n.
tv. *A. paludana* ø.
A. badiana i
midten og *A.*
kennelli n. th.



A. unculana har et stort, ensfarvet, rødbrunt, trekantet felt udenfor den lyse tværlinje, *myrtillana* har en uregelmæssig afgrænsning af det lyse felt i rodfeltet.



A. paludana har 3 sorte punkter i frynserne, som dog kan være smeltet lidt sammen, *A. badiana* har et punkt eller ingen mens *unculana* har en lang mørk streg indenfor frynserne. Hos *kennelli* går tværlinjen næsten helt gennem vingen og er meget skrå, inadbøjet.



Ancylis myrtillana (Tr.)



12-16 mm. Hannen er størst. Imago flyver over Mosebølle fra sidst på dagen, af og til i stort antal fra sidst i maj til midt i juli. Hunnen er meget mere kontrastrig.

Dania SZ:
Holmegårds Mose
20.5.2010 E. Palm

Ancylis myrtillana (Tr.)



Dania NEZ:
Lyngby Mose
26.5.1971 E.Palm
Genit. 3732 NLW

Larven lever i august- september i mellem to sammen-
spundne blade på Blåbær (*Vaccinium myrtillus*) og Mose-
Bølle (*V. uliginosum*). Larven overvintrer i sidst hudskifte og
forpupper om foråret i april-maj.


Ancylis myrtillana (Tr.)



DANIA, SJ, MG71
Toftum, Rømø
27.5.2012 E.Palm


Arten hører til på fugtige heder og næringsfattige ende, hvor foderplanten gror. Den kan også træffes i skovmoser.

Ancylis myrtillana (Tr.)



I Danmark er arten meget lokal, men ofte til stede i antal, hvor den forekommer. Den er udbredt i Nordøstsjælland, i Åmose-området og i Holmegårds mose på Sjælland, Ulvshale og Horreby Lyng i LFM, Bornholm og det nordlige Jylland. Men i Jylland bliver den sjældnere mod syd og kun på Rømø er der mange. I Skandinavien går arten helt op til Ishavet. I Europa kun i de nordlige og mellemste dele, desuden Sibirien og de russiske dele af Fjernøsten.

Ancylis apicella (D. & S.)




Dania: EJ, NH32 12-17 mm. Imago er aktiv både formiddag og eftermiddag/aften og dukker af og til op på lyset. Den flyver i lyse skove, moser og langs hegn, hvor foderplanten står, i to generationer fra sidst i maj gennem juni og igen sidst i juli. Forårsgenerationen er noget hyppigere.

Nordskoven,

Silkeborg

10.6.2015 E.Palm

Ancylis apicella (D. & S.)



Larven lever mellem spundne blade af Tørst (*Frangula*) og Vrietorn (*Rhamnus*) i juni-juli og fra august til april. Den pupper i foråret. Længere sydpå nævnes en række andre foderplanter, f. eks. Liguster, Kornel og Slåen, men det er næppe aktuelt i Norden.

Dania: NEJ, NJ86
Åsted Ådal e.la.3.6
2018, kl. 25.6.2018
Frangula E.Palm

Ancylis apicella (D. & S.)



Almindelig de fleste steder i Danmark, også i de områder, hvor der tidligere ikke var så mange prikker på udbredelseskortet. Nordgrænsen går gennem det sydlige Norge, gennem Sverige til bunden af den Botniske Bugt og videre mod øst. Europa og videre mod øst til Japan.

Dania: NEJ, NJ86
Åsted Ådal e.la.3.6.
2018, kl. 25.6.2018
Frangula E.Palm

Ancylis paludana (Barret)



SUECIA NB
Seskarö
UTM 34W FT2589
15.6.1983
Ingvar Svensson

10-14 mm. Imago ses ikke meget flyvende. Den flyver sidst på dagen og kommer om natten til lys. Den hører til på strandenge og er fremme i den sidste del af juni. I Danmark er den også fundet tidligere. Her er der formentlig tale om to generationer, dels i maj-juni og dels i juli-først i august. Den er meget lokal også i Sverige, men af og til fundet i lidt større antal.


Ancylis paludana (Barret)



Denmark: LFM,
Elkenøre Strand
54°43'00N·12°43'00E
17.v. - 1.vi. 2015.
Leg. G.J. Jeppesen

Larven lever i august-september mellem spundne blade på Fladbælg (*Lathyrus*). Den forpupper i en aflang kokon om foråret. Mange steder er arten tweekuldet. Så er sommerkuldets larve fremme i juli.

Ancylis paludana (Barret)




Relativt nyopdaget i Danmark, men nu fastboende på de østvendte kyster i landets sydøstlige dele. Den er stadig sjælden og langt de fleste eksemplarer er fundet på lys. I Sverige kendes arten kun fra Nb. (i bunden af den Botniske Bugt) og i Finland kun i det aller sydvestligste. Også kendt fra Estland og Letland. I Europa kendes den pletvist fra England, Tyskland (Bayern, Brandenburg, Sachsen og Thüringen), Østeuropa, Sibirien til Kina.

Ancylis habeleri Huemer & Tarmann

= rhenana auct.

5072



LATVIA: Dgp.
Silene, Ilgas
01-04.07.1999
N.Savenkov

12-15 mm. Imago skal flyve i to generationer i maj-juni og juli-(august). Larven er ukendt. Den kendes fra det sydligste Finland og i alle de Baltiske lande. I det øvrige Europa kun kendt fra Schweiz, Østrig og Tyskland (kun ældre fund fra Bayern).

Ancylis badiana (D. & S.)

5073



DANIA, SJ, MF79
Tingdal skydeb. la.
15.6.2016, kl. 6.7.
Strandært E.Palm

11-17 mm. Imago flyver livligt hen mod solnedgang og kommer jævnligt til lys. Der kan være mange af dem på strandenge og andet åbent land. Den optræder også i lyse skove. To generationer maj-juni og august. Hunnen er lidt mere bredvinget og mindre end hannen.

Ancylis badiana (D. & S.)



Dania NWZ:
Veddinge Bk.
e.la.16.6.1981, kl.
14.7.1981 E.Palm

Trifolium .

Larven lever mellem spundne blade på ærteblomstrede. F. eks. Vikke (*Vicia*), Fladbælg (*Lathyrus*) og Kløver (*Trifolium*) i juni og overvintrende fra september.




Ancylis badiana (D. & S.)



I Danmark er *badiana* fundet over hele landet og i Skandinavien går arten højt mod nord, uden dog at nå Ishavet. Den er udbredt i Europa og når mod øst til Japan.

Dania: SJ, MF79
Tingdal skydeterr
6.5.2018 E.Palm

Ancylis achatana (D. & S.)



14-19 mm. Imago er nataktiv, men kommer fint til lys fra sidst i juni til begyndelsen af august. Arten hører til i lyse skove, i parker og hegn.

Dania: SJ, MF89
Sdr. Sejerslev
8.7.2014 E.Palm

Ancylis achatana (D. & S.)



Dania NWZ:
Føllenslev
15.7.1978 E.Palm

Larven opgives at leve i overvintrende til april-maj i et bladrør, der er fæstnet til en kvist på Tjørn (*Crataegus*), Slåen (*Prunus spinosa*), Brombær (*Rubus*) og en række andre buske og frugttræer. Den overvintrer i 3. hudskifte og skal således æde også om foråret.


Ancylis achatana (D. & S.)



Dania: NWZ
Føllenslev
23.7.2003
E. Palm

Der er ikke megen variation, men arten afstøves let, så det er vanskeligt at finde helt pæne eksemplarer. Let kendelig.

Ancylis achatana (D. & S.)



I Danmark er *A. achatana* ret almindelig mod øst, mens hyppigheden aftager mod vest og i hele det vestlige Jylland er der ikke mange fund. I Skandinavien findes arten i det allersydligste Norge (kun to findesteder), mest langs kysterne i den sydlige del af Sverige og helt mod sydvest i Finland. Alle de baltiske lande. Europa til Lilleasien og Ural.

Ancylis mitterbacheriana (D. & S.)

5076



13-17 mm. Imago flyver fra sidst på eftermiddagen omkring egene. Somme tider kan man stille sig under en eg og se, hvordan de flyver frem og tilbage over kronerne. Der er kun en generation i maj-juni. Arten kommer også til lys. Den hører til i skove og krat med eg.

Dania: WJ, MG45
Bordrup Plt. e.la.9.4.
2018, kl.27.4.2018
Quercus E.Palm

Ancylis mitterbacheriana (D. & S.)



Larven lever i et sammenspundet blad af eg (*Quercus*) fra august og overvintrer i sidste hudskifte. Om foråret kan man jævnligt finde den lille "båd" af blade på træer, der har beholdt bladene vinteren over. Den er let at klække. Den skal også kunne leve på Bøg (*Fagus*), men her har jeg aldrig kunnet finde den, selvom også unge bøge jævnligt beholder de visne blade vinteren over .

Ancylis mitterbacheriana (D. & S.)



Imago er så køn, at man har lyst til at tage billeder i en uendelighed. Det er også en af de første viklere der klækker og dermed bebuder, at nu er højsæsonen tæt på.

Dania: NEJ, NJ87
Jerup Hede
18.5.2014 E.Palm

Ancylis mitterbacheriana (D. & S.)



Der er en smule variation i farven. I Danmark er arten almindelig i alle landsdele. I Skandinavien går den mod nord til det sydlige Norge, mellemste Sverige og sydlige Finland. Desuden Baltikum. Den forekommer i hele Europa og går mod øst til Lilleasien.

Dania NWZ:
Kongsøre Skov
6.6.1980 E.Palm



Dania: SJ, MG90
Lourup Skov.e.la.
8.10.17,kl.22.3.18
Quercus E.Palm

Ancylis tineana (Hb.)



Dania: NEJ, NJ88
Bunken •
26.5.2018 E.Palm

12-16 mm. Imago flyver enkeltvist omkring enkeltstående (unge) birke hen mod aften fra sidst i maj gennem juni. Den holder til på heder og langs kanterne på højmoser. Der er nogen variation i farven fra grå til brunlig.

Ancylis tineana (Hb.)



Larven lever fra august-september på Birk (*Betula*), hvor den iflg. Svensson danner et rør mellem bladene. Den overvintrer og forpupper sig om foråret. Her har jeg fundet den mellem birkeblade. Der opgives mange andre foderplanter, f. eks. Bævreasp (*Populus tremula*), Tjørn (*Crataegus*), Slåen (*Prunus spinosa*) m.v., men det er nok ikke aktuelt i Norden.

**Dania NWZ:Løgt-
ved Plt.e.la.23.4.78
KI.16.5.1978 E.Palm
*Betula***



Ancylis tineana (Hb.)




Hunnen er noget mindre end hannen og ofte lidt mørkere.
Arten er let kendelig på det store, brede spejl

Dania NEZ
Melby Overdrev
12.5.1971 E.Palm



Ancylis tineana (Hb.)



I Danmark er *tineana* meget lokalt forekommende og temmelig sjælden. Enkelte steder og dage kan den dog godt forekomme i noget større antal. Nordvestgrænsen følger næsten grænsen mellem Sverige og Norge. Der er dog enkelte fund lidt ind i det sydlige Norge. Arten når godt nord om den Botniske Bugt og dækker næsten hele Finland og hele Baltikum. I Europa mangler arten mod sydvest, men er fundet i England, Belgien og Tyskland. Mod øst til Fjernøsten.