

Olethreutini 4

Argyroploche og flere mindre slægter

Capricornia boisduvaliana (Dup.)



SUECIA Nb Ropnäs
Åtrask
RN 72699 17377
2000 06 30
Leg Jan-Olov Björklund

14-18 mm. Imago er aktiv i aftentimerne fra sidst i juni til midt i juli. Den kan være talrig, hvor den forekommer, men den er meget lokal på blomsterenge i bjergene. Let kendelig.

Capricornia boisduvaliana (Dup.)




Larven lever i spundne blade af Hare-Kløver (*Trifolium arvense*). Den overvintrer halvvoksen og er udvokset i juni.

SUECIA NB
Åtrask
UTH 34W DT9758
8.7 .1998
Ingvar Svensson

Udbredt i det meste af Palaearktis, undtagen Storbritannien og Afrika. I Sverige er arten stabil på lokaliteten Nb. Piteå; Åtrask og også fundet i Nb.: Kengis, Vb: Brännberget og To.: Masungsbyn, alle steder meget lokal, Desuden i det centrale og sydlige Finland og de baltiske lande. Den var tidligere meget mere almindelig i Skandinavien, men er gået tilbage. Ingen

Capricornia boisduvaliana (Dup.)

Bengt-Åke Bengtsson har
venligst ladet mig bruge
kortet over de
nuværende svenske
findesteder



Pristerognatha penthinana (Guenée)



Dania: NWZ:Kattrup
Skov e.la. 3.5.79, kl.
20.5.1979 E.Palm
Impatiens nontangere

14-17 mm. Arten flyver hen mod aftenen i fugtige skove i juni. Den er meget lokal og ses ikke ofte. Let kendelig på det gule vingehjørne.



Pristerognatha penthinana (Guenée)




Dania NWZ:Kule-
bjerg Skov/Skellebj.
e.la.25.3.2010, kl.
12.4.2010 E.Palm
Impatiens nontangere

Larven lever overvintrende på Spring-Balsamin (*Impatiens non-tangere*) og kan findes i roddelen af de visne stængler hele vinteren. Den forpupper samme sted. Den er let at klække.



Pristerognatha penthinana (Guenée)



Udbredt i Europa fra de Britiske Øer til Ural og videre til Nordvestkina. I England sidst set i 1914. Ingen fund i Slesvig-Holsten eller Niedersachsen. Nordgrænsen går i det sydlige Skandinavien, hvor arten forekommer omkring Oslo-fjorden og i vestlige Sydsverige. I Danmark er arten ikke kendt fra Bornholm og det vestlige Jylland, temmelig udbredt på Sjælland, LFM og EJ, og i øvrige kun kendt i enkeltfund.

Pristerognatha fuligana (D. & S.)



Dania: SJ: Als
Nørreskov
14.6.1984 E.Palm

11-17 mm. Imago flyver hen mod aftenen men ses ikke ofte. Den holder til de samme steder som *penthinana* fra sidst i maj gennem juni. Arten mangler det gule vingehjørne som *penthinana* har.


Pristerognatha fuligana (D. & S.)



Dania NWZ:Skar-
resø N(Jyderup)
e.la.24.3.2010, kl.
21.4.2010 E.Palm
Impatiens nontangere

Larven lever overvintrende i stænglerne af Spring-balsamin (*Impatiens non-tangere*) og kan findes i de gamle stængler vinteren igennem. Den forpupper i de mellemste stængeldele og er let at klække. I Sverige er den klækket fra *I. glandulifera*, som hører hjemme i Himmalaya, men har bredt sig fra haverne.

Pristerognatha fuligana (D. & S.)



Kendt fra de centrale og østlige dele af Europa. Mod øst til Japan. I Skandinavien kun kendt fra det allersydligste Sverige og Finland.

I Danmark er arten først erkendt i 1977 og stadig sjælden og enkeltvist forekommende. Enkelte steder er larven dog fundet i lidt større antal.

Cymolomia hartigiana (Sax.)



**Dania: NWZ:Ordrup
v. Ordrup Næs
26.7.1978 E.Palm**

14-18 mm. Imago er overvejende nataktiv og ses derfor sjældent om dagen. Men arten kommer fint til lys i juli- første halvdel af august. Den hører til i granskove og granplantager. Let kendelig.


Cymolomia hartigiana (Sax.)



**Dania: NWZ:Ordrup
v. Ordrup I næs
28.7.1980 E.Palm**

Larven lever fra august til først i juni mellem spundne nåle på Rødgran (*Picea abies*) og Almindelig Ædelgran (*Abies alba*).

Cymolomia hartigiana (Sax.)



Udbredt i de centrale og nordlige dele af Europa og videre til Kina og Japan. Nordgrænsen går gennem de allersydligste dele af Norge, den sydlige tredjedel af Sverige og den sydlige del af Finland. I Danmark har arten efterhånden fundet vej til alle dele af landet. C. S. Larsen kendte den i 1927 kun i 4 stk. fra Bornholm. Den er stadig ret enkeltvist forekommende, almindeligst mod øst.


Argyroploche arbutella (L.)



Dania: NEJ: Oudrup
Østerhede e.l. 22.5.
Melbærris, kl.
25.6.2000 E. Palm

13-16 mm. Imago flyver tæt hen over foderplanten fra sidst på eftermiddagen i juni-juli. Den holder til på heder med melbærris. Let kendelig.


Argyroploche arbutella (L.)



Dania: NEJ: Oudrup
Østerhede e.l. 22.5.
Melbærris, kl.
12.6.2000 E. Palm

Larven lever i maj mellem spundne blade af Melbærris (*Arctostaphylos*). I Mellemeuropa også Tyttebær (*Vaccinium vitis-idaea*). Den er let at klække. Oplysningen om at arten skulle være 2-årig er problematisk.

Argyroploche arbutella (L.)



Udbredt fra Spanien til Ural, men først og fremmest i et nordligt bælte. Mest i bjergene. Kun gamle fund i det nordlige Tyskland. I Skandinavien op til Ishavet. I Danmark er arten ikke sjælden på de jyske heder, hvor den kan forekomme i større antal, men begrænset af planten, som har sin hovedforekomst i den nordlige halvdel af Jylland. Et indslæbt fund fra Sjælland (Lynge) er ikke medtaget på kortet.

Argyroploche aquilonana (Karvonen)



SUECIA T.1pm.
Pältsa 700-1200 m
9-19.7.1964
Ingvar Svensson

15-16 mm. Imago er en hurtig flyver i dagtimerne på solrige bjergskrånninger i juli. Larven er ukendt. Den er pletvist udbredt i det allernordligste Skandinavien, Kola og videre mod øst og også i Canada.

Argyroploche noricana (H.-S.)



SUECIA To
10.7 1982
Björkliden,
Nuolja
RN 1618/7591
G. Palmqvist

14-16 mm. Imago er aktiv både dag og nat fra sidst i juni til midt i juli, hvor den flyver over rypelyng, somme tider lokalt talrigt. Arten ligner *A. aquilonana*, men det lyse tværbånd er zigzag-formet.

Argyroploche noricana (H.-S.)



12911 SUECIA Hr
Helagsfjället
UTM 33V, UK 7475
10.VII.1975
leg. B. Bengtsson

Larven er ukendt. Arten er boreomontan og findes i Skandinaviens fjelde, Alperne, Tatra, Bulgarien og NE Rusland. I Tyskland kun i Bayern.

Argyroploche leadiana (L.)

4768



LATVIA: Rīg.
Kēmeri ex 1,
28.5.2004
N.Savenkov

12-14 mm. Arten er aktiv i dagtimerne i juni-juli, hvor den svirrer over foderplanten. Overvejende en bjergart. I Sverige er den lokalt almindelig. Grundfarven er mere brun end hos *externa* og der er et lyst indslag i frynserne i det bageste vingehjørne.

Argyroploche lediana (L.)




3593 SUECIA Sm.
Ålghult
UTM 33V. WD-0118
el 1-13.6.1974
Ingvar Svensson

Larven lever fra august til maj i blomster og blade af Mose-Post (*Ledum palustre*). Den er let at klække. Udbredt i de nordlige dele af det centrale Europa, bortset fra de Britiske Øer, og videre til Japan. Nordvest-grænsen følger omtrent grænsen mellem Norge og Sverige til Ishavet. Der er også ældre fund fra Slesvig-Holstein.

Argyroploche externa (Evers.)

= dalecarliana (Guenée)

4769



Dania NEZ:Tisvilde
Hegn e.la.18.3.10, kl.
16.4.2010 E.Palm
Pyrola

12-15 mm. Imago er aktiv om dagen men sjældent set flyvende. Den flyver i juli i skove, overvejende lyse fyrreskove.




Argyroploche externa (Evers.)




Dania NEZ:Tisvilde Larven lever i et sammenspundet blad af Vintergrøn
Hegn e.la.18.3.10, kl. (*Pyrola rotundifolia*). Den overvintrer som næsten
14.4.2010 E.Palm voksen og er let at klække. PS. Den lyserøde farve
Pyrola • tåler ikke alle slags gifte.

Argyroploche externa (Evers.)



Udbredt i de nordlige og centrale dele af Europa og videre til Fjernøsten. Også Canada. Ingen fund i det nordlige Tyskland. Nordgrænsen går op til omkring polarcirklen, men den mangler mod vest i Norge. I Danmark er arten kun kendt fra Bornholm (Ølene i antal 1956, derudover strejfare), en forekomst i Tisvilde Hegn (hvor arten stadig findes) og en tilsvarende forekomst i Svinkløv i NEJ (hvor arten ikke er set i mange år).

Argyroploche roseomaculana (H.-S.)



Dania: NEZ:Tisvil- 16-18 mm. Imago er aktiv i dagtimerne i juli, men ses sjældent. Det er et
de Hegn e.la.4.4.81, skovdyr. Lidt større end *externa* og med en ekstra lyserød plet i det bageste
kl.25.4.1981 E.Palm vingehjørne.
Pyrola •


Argyroploche roseomaculana (H.-S.)



Dania: NEZ:Tisvil-
de Hegn e.la.4.4.81,
kl.24.4.1981 E.Palm
Pyrola •

Larven lever – overvintrende indtil maj – i bladene af Mose-Vintergrøn (*Pyrola rotundifolia*) og er let at klække. Den er lettest at finde inden der kommer grønne blade for larven "klipper" de sammenspundne blade af, så de ligger løst i skovbunden mens den gør sig færdig til forpupning.

Argyroploche roseomaculana (H.-S.)



Kendt fra Skandinavien, Estland og Letland, Højælperne og Rumænien, men også et sted i Fjernøsten. I Skandinavien når den Ishavet men mangler i de vestlige dele af Norge. Der er et ældre fund i Slesvig-Holstein.


I Danmark kendes arten fra Bornholm (Rutsker Højlyng larver 1975 & 76) og Tisvilde Hegn i Nordsjælland, hvor den tidligere (indtil 80'erne) blev fundet som larve. I 70'erne blev den fundet sammen med *externa*, siden længere inde i den mørkere skov. Det er dog efterhånden længe siden den er set i Danmark.

Argyroploche concretana (Wck.)

4771

- Billede haves ikke men arten ligner en lille *mygindiana* med hvide skæl iblandet tegningen.
- 14-16 mm i Skandinavien, 12-15 i øvrigt. Imago er aktiv i dagtimerne i åbne granskove op i birkebæltet fra sidst i juni gennem juli og kan ind i mellem findes siddene på træstammerne. Boreomontan. I Europa i Skandinavien, hvor den findes i bjergene fra det mellemsste Sverige, hvor den er udbredt, men sjælden og nordpå til Ishavet, det meste af Finland og Estland. Videre til Fjernøsten og også i Canada.

Stictea mygindiana (D. & S.)



DANIA, WJ, MG77 14-19 mm. Imago er aktiv fra de sene eftermid-
Nørholm Hede la. dagstimer fra sidst i maj gennem juni til først i juli på
10.5.2016, kl. 20.5. åbne pletter i skove, specielt nåleskove, i Danmark
16 E.Palm Tyttebær overvejende på heder. Den ses også enkeltvis på lys.



Stictea mygindiana (D. & S.)



DANIA, WJ, MG77
Nørholm Hede la.
10.5.2016, kl. 23.5.
16 E.Palm Tyttebær


Larven lever overvintrende (som ganske lille) på Tyttebær, Mose-Bølle, Melbærris og Pors (*Vaccinium*, *Arctostaphylos*, *Myrica*) indtil maj. Den begynder at æde efter overvintringen i april og er let at klække.

Stictea mygindiana (D. & S.)




Det røde kan mangle helt og i bjergene kan størrelsen kan være betragteligt mindre end normalt.

Stictea mygindiana (D. & S.)



Udbredt i de nordlige og centrale dele af Europa. Nordgrænsen går i Skandinavien et godt stykke nord for polarcirklen. I Danmark er arten udbredt i den nordlige halvdel af Jylland, men i øvrigt sjælden og enkeltvist forekommende. I Nordsjælland og Åmosen er arten fast, i øvrigt kun kendt fra strejfare. Ingen fund i Slesvig-Holstein.

Olethreutes subtilana (Flkv.)



Arten er mindre og ikke så kontrastrig som *O. arcuella*, men svær at kende.

Austria: N.-Tirol
Walchsee
15.6.2011 E.Palm

11-15 mm. Imago er aktiv fra sidst på dagen i juni-juli. Den er ikke så kendt fordi den har været sammenblandet med *O. arcuella*. Den flyver i højmoser i Centraleuropa og er kendt helt til Japan. Den er også fundet i Letland. Larven er ukendt.

Olethreutes arcuella (Clerck)



14-18 mm. Imago er aktiv i dagtimerne, specielt hen under aften, hvor den flyver over trætoppene på lysninger i skove. Fra maj til juli. For at være sikker i adskillelsen fra *O. subtiliana* må man lave genitalpræparat.

Dania: SJ, MG91
Lindet Skov
22.6.2015 E.Palm

Olethreutes arcuella (Clerck)




Larven lever overvintrende fra august til april på visne, nedfaldne blade.

Dania: B:Olsker
26.6.1974 E.Palm



Olethreutes arcuella (Clerck)



Den er udbredt i Europa til Ural og videre til Kina. Nordgrænsen går gennem det sydlige Norge, til den Botniske bugt og det mest af Finland. I Danmark er arten mere eller almindelig i det meste af landet, undtagen det vestlige Jylland og Fyn. Måske er den blevet almindeligere i de senere år? Den er ofte talrig, hvor den forekommer.

Piniphila bifasciana (Hw.)



Dania: NWZ: 11-16 mm. Imago er aktiv hen mod aften og svirrer omkring fyrregrenene.
Føllenslev Den dukker op midt i juni og kommer jævnligt til lys. Den hører til i
1.7.2010 E.Palm fyrreskove og sommerhusområder. Let kendelig.

Piniphila bifasciana (Hw.)



DANIA, SJ, MG71
Twismark, Rømø
29.7.2013 E.Palm

Larven lever i maj- juni i spind mellem blomster og unge skud af Fyr (*Pinus*).

Piniphila bifasciana (Hw.)



Dania: NWZ: Fra Europa til Fjernøsten og Japan. I Skandinavien går
Yderby Lyng nordgrænsen i det sydøstlige Norge, det mellemste og nordlige
10.7.2010 E.Palm Sverige til bunden af den Botniske Bugt og det meste af Finland.
I Danmark er arten mere eller mindre almindelig overalt.



Pseudohermenias abietana (F.)



Dania: NWZ:
Føllenslev
15.6.1980 E.Palm

14-18 mm. Imago flyver hen mod aften i granskove og plantager, kan let bankes ud også tidligere på dagen og kommer til lys. Fra juni og et stykke ind i juli. Let kendelig.

Pseudohermenias abietana (F.)



Larven lever overvintrende indtil maj mellem nåle på Rød-Gran (*Picea abies*) og Almindelig Ædelgran (*Abies alba*). Den kan også leve på Fyr (*Pinus*), men det hører til undtagelsen.



DANIA, SJ, MF89
Gallehus Skov
5.6.2017 E.Palm

Udbredt fra Europa til det vestlige Sibirien. I Nordeuropa går grænsen nord for Polarcirklen, men arten mangler i de vestlige dele af Norge. I Danmark er arten udbredt, men sjældent talrig i hele landet.

Pelatea klugiana (Freyer)

4784



19-23 mm. Imago er aktiv hen mod aften i juni-juli. Bjergart. Larven lever i skud af *Peonia rosea* i april-maj.

Kendt fra Spanien til Kroatien og Ukraine (Karpaterne). Ikke i Nordeuropa. Ingen pålidelige fund i Tyskland. Men meldt fra Holland.