


Pammene & Cydia mv.

3: Cydia

Biologi, udseende og samlertips
49 arter i alt i Europa


Cydia blackmoriana (Wlsh.)



LIBYA, Charian
Wadi el Hira
10.12.1982
Uffe Seneca Nielsen

14-16 mm. Imago flyver i maj-juni og (oktober). Larven lever i frugterne Af *Colutea*. Imago kommer til lys. Italien, Portugal, Grækenland.


Cydia nigricana (F.)



Dania: SJ, MF89
Emmerlev
7.6.2014 E.Palm

11-16,5 mm. Imago er fremme i Juni-juli (september).
Den flyver i aftensolen omkring foderplanterne.

Cydia nigricana (F.)




Dania SJ: Sønderborg

Vestermærk

19.6.1977 E.Palm

Larven på forskellige ærteblomstrede. Skadedyr på Ært.
Eksemplaret ovenfor er lysere omkring hoved/thorax. Arten er
Kendelig på de næsten hvide bagvingefrynser. Udbredt i Europa,
undtagen i sydøst.


Cydia succedana (D. & S.)



Dania: NWZ
Korshage/Rørvig
30.5.1981 E.Palm

12-16 mm. Imago findes fra midt maj-august (to kuld). Den flyver omkring foderplanten sidst på dagen. Hele Europa.

Cydia succedana (D. & S.)




Dania: NEJ, NJ94
Lyngsø Sønderklit
17.5.2014 E.Palm

Larven lever på Gyvel, *Ulex*, *Genista* mv. i juni og september-oktober. Den sene generation overvintrer i en kokon i jorden.

Cydia vallesiaca (Sauter)

5123



France (04) Alpes-
de-H.-Provence:
Col-des-Leques
26.6.2011 E.Palm

12-13 mm. Arten findes i juni-juli. Imago flyver over foderplanten sidst på eftermiddagen. Larven lever i stænglerne af *Ononis rotundifolia* (rundbladet krageklo).

Cydia vallesiaca (Sauter)



France (05) Hautes
Alpes; Prunières
ca. 1200 m.o.h.
19.7.2017 E.Palm

Kendt fra Frankrigs, Spaniens og Schweiz' bjerge.
Ikke sjælden.

Cydia centralasiae Obr.

(=*intexta* Kutz.)

5124



France (12) Aveyron
Roquefort-s.-Soulzon
25.6.2010 E.Palm

11-12 mm. Arten er fremme fra maj til august. Imago flyver over foderplanten. De præimaginale stadier er ikke beskrevet (se næste billede). Mellem- og Østeuropa.

Cydia centralasiae Obr.



Den hidtil ukendte foderplante for arten.

Cydia albipicta (Sauter)

5126



Schweiz, Wallis
Grimselpas, 2000
5.7.2011 E. Palm

13-14 mm. Imago i juli, flyvende over vegetationen ved aftenstid. Præimaginale stadier ukendte. En bjergart. Arten er temmelig variabel og kan findes, hvor der slet ikke vokser planter.

Cydia albipicta (Sauter)




France (73) Savoie
Col de la Croix de
Fer 2046 m.o.h.
3.7.2016 E.Palm

Arten er temmelig variabel og kan findes, hvor der slet ikke vokser planter. I 2010 blev arten meldt fra Norge. Her er den - meget overaskende – bofast og kendt fra nogle lokaliteter i Opland (On) og i 2013 også i Sogn og Fjordane (SFi (Lærdal)) (Aarvik et al., 2015). I øvrigt i Alperne og Rumænien, men sikkert overset.

Cydia adenocarpi (Rag.)


5127



France Landes (40)
Louer 10.3.2009
E. Palm

12,5-15 mm. Imago i juni-juli og august-først i september.
Imago kommer til lys. Det vestlige Central/Sydeuropa.

Cydia adenocarpi (Rag.)



France (40)
Louer •
2.9.2008 E.Palm

Larven lever i to generationer i frugterne af *Adenocarpus* og *Sorothamnus* i juni-juli og overvintrende fra august. Sikkert let at overse og forvekslet.

Cydia medicaginis (Kutz.)

5125



Dania B: Hammer
Havn
28.6.1974 E.Palm

9-12 mm. Arten er fremme i maj- først i august. Imago flyver over foder-
Planten om eftermiddagen.


Cydia medicaginis (Kutz.)



Dania: LFM: Møns
Klint (v. fyret)
21.7.2010 E.Palm

Larven på forskellige ærteblomstrede, bl. a. *Medicago*. Den har optrådt som skadedyr på Ært. Den overvintrer. Eksemplaret ovenfor er lysere omkring hoved/thorax. Bagvingefrynserne er ikke hvide som hos *nigricana*.

Cydia medicaginis (Kutz.)



Spredt gennem det meste af Europa. I Danmark er arten meget lokal, men somme tider at finde i antal. I Tyskland kun kendt fra Thüringen! I alle lande i Nordeuropa undtagen Norge.

Cydia microgrammana (Guenée)

5128



France (04) Alpes-
de-H.-Provence:
Castellane
24.6.2011 E.Palm

10-12 mm. Imago flyver i juni – juli over foderplanten sidst på dagen.
Den er ikke meget flyvende.


Cydia microgrammana (Guenée)



Dania NWZ:
Nekselø
8.6.1980 E.Palm

Hunnen har en lidt anden vingefacon. Larven overvintrer. Den æder de umodne frø af *Ononis* (krageklo). Den pupper i jorden.

Cydia microgrammana (Guenée)



Europa, undtagen i nord. Lokal og enkeltvis i Danmark.
Dog også kendt fra Sverige, Finland, Estland og Letland.

Cydia duplicana (Zett.)


5131



Dania NWZ:Eske-
bjerg Vesterlyng
10.6.1977 E.Palm

13-19 mm. Imago flyver, eller kan bankes ud fra enebærbuske fra midt i maj til juli. Bedst sidst på dagen i solskin. Larven u. bark på *Juniperus* (Ene) i DK. Spejlet er indvendigt kantet med hvidt.

Cydia duplicana (Zett.)



Udbredt, men mest enkeltvis i Danmark, enkelte dage og steder dog i større antal. I Tyskland ingen nyere fund!, men udbredt i Europa. Kendt fra alle lande i Nord.

Cydia cognatana (Barret)


5132



Sjælland
Lyngby mose
puppe: 2-6-1977
klæk: 7-6-1977
H. Hendriksen

12-15 mm. Imago i juni omkring Fyr. Larven overvintrer fra august u. bark på *Pinus sylvestris* og puppen kan findes her, lavt på stammen. Oftest i forbindelse med højmoser.

Cydia cognatana (Barret)



Nordeuropa. Lokal og meget spredt i det øvrige Europa. Ikke mod øst. Sjælden. I Tyskland et fund i Nordrhein-Westfalen i 2011, men ellers ingen nyere fund og i øvrigt kun kendt fra Bayern og Thüringen. Ikke kendt fra Lithauen.

Cydia illutana (H.- S.)

5133



Dania NEZ: Bose-
rup Skov e.la. 1.6. 77.
kl. 10.6.1977 E.Palm
Larex (bark)

12-13 mm. Imago i juni-juli. I flg. litteraturen lever larven i koglerne og går derefter ud og gemmer sig i jorden.

Cydia illutana (H.- S.)



Dania LFM: Bøtø
e.la. 4.5.1974, kl.
14.5.1974 E.Palm
Larex (bark)
Genit:14/1977


I Danmark finder vi larven eller puppen u. bark af Europæisk Lærk.
I Mellemeuropa lever den også på Gran og Ædelgran.
Den kan selvfølgelig også tages flyvende, normalt højt til vejrs.

Cydia illutana (H.- S.)



Larvens "hule" under lærkebark i maj.

Cydia illutana (H.- S.)



Nord- og Mellemeuropa. Sikkert ofte overset. Sjælden.

Cydia conicolana (Heyl.)

5134



Dania F: Gylden-
Sten e.la.2.3.80, kl.
5.4.1976 E.Palm
Pinus nigra (kogle)

10-13 mm. Imago i maj-juni. Den flyver over kronerne i solen.

Cydia conicolana (Heyl.)



Dania NWZ:Klint
e.la.16.5.1976, kl.
1.6.1976 E.Palm
Pinus nigra (kogle)

Larven lever altovervejende i koglerne på *Pinus nigra* (østrigsk fyr) (med de lange nåle). Den er også dog rapporteret fra andre fyrrearter.

Cydia conicolana (Heyl.)



Larven overvintrer og viser ingen tegn på gnav før den klækker. Det hele foregår i et enkelt dækskæl på koglen. Størst klækkeprocent fås hvis man venter til april-maj med at tage koglerne ind. Koglerne er lukkede når de skal plukkes.

Cydia conicolana, *coniferana* og *cosmophorana* (de små arter)



Cydia conicolana: tværstriberne sølvfarvede. Farven afhænger lidt af den vinkel, man ser den i. Ingen hvid plet i/ved frynserne.




Cydia cosmophorana: Tværstriberne hvide. En lille, hvid plet i/ved frynserne.



Cydia coniferana har også den hvide plet, men det inderste midtbånd spidser ud i midten. Tværstribernes kantpletter er dobbelte.


Cydia conicolana (Heyl.)



Tidligere opfattet som meget sjælden, men i Danmark i det store hele udbredt med den østrigske fyr. Mellem- og Sydeuropa. Kun enkelte, helt nye fund i Sverige (Skåne, Halland, Öland). Ikke i øvrigt i Nordeuropa.

Cydia corollana (Hb.)

5135



Dania 14 Hviding larv
P. Populus tremula i galle af
Saprosia populnea 17.5.
W. 26.5. 1870. P.L. Holst.


11-13 mm. Imago flyver først i juni omkring Bævreasp.

Cydia corollana (Hb.)



Larven lever overvintrene i sår på *Populus tremula*. Ofte i gamle *Saperda*-galler. Man kan se smuldet fra larven langs med midtrevnen i skaden på kvisten.


Cydia corollana (Hb.)



Udbredt i Europa, men hovedforekomsten er i Nordeuropa. I Skandinavien kun i de østligste dele. I Mellem- og Sydeuropa meget spredt. Arten mangler i mange lande, f. eks. Holland og Italien.

Cydia coniferana (Sax.)

5136



Dania EJ:
Asserbo.
22.7.1987 E.Palm

10-15 mm. Imago flyver i (juni)-juli først i august omkring fyr.


Cydia coniferana (Sax.)



Dania NWZ: Vig:
Jyderup Skov
18.6.1979 E.Palm

Larven lever overvintrende i et silkespind u. bark af forskellige Fyrre-arter, måske også ædelgran. Spindet med ekskrementer kan findes på unge fyr.

Cydia coniferana (Sax.)



Dania NWZ:Ordrup
v. Ordrup Næs
19.6.1979 E.Palm

Et eksemplar med et "forkert" linjeforløb.

Udbredt i det meste af Europa. Den almindeligste af de lignende arter.

Cydia coniferana, *cognatana* og *illutana*



Cydia coniferana. Spidsen i midtbåndet peger mod den lille hvide plet (som *ikke* går helt ud i frynserne) inden frynserne. Arten flyver senere end de øvrige.



Cydia cognatana. Spidsen i midtbåndet peger mod vingespidsen og den lille hvide plet går helt ud i frynserne. Midtbåndet er ikke sammenhængende. En lidt større art.



Cydia illutana. Midtbåndet er ikke sammenhængende, kantpletten står ikke vinkelret på vingekanten. Meget mørk. Mere på næste billede. Også Lidt større end *coniferana*.

Cydia illutana, duplicana og indivisa



***Cydia illutana*.**

Midtbåndet meget svagt, næsten lodret fra randen, mod kanten opløst i to korte kantpletter med større mellemrum end hos de øvrige arter.



***Cydia duplicana*.**


Midtbåndet er ikke sammenhængende, og kantpletten står skråt på vingekanten. Spejlet er kantet af en hvid/blylinje



***Cydia indivisa*.**

Midtbåndet er ikke sammenhængende, kantpletten står vinkelret på vingekanten og der er ingen delelinje i pletten for neden. Spejlet er ikke kantet af en blylinje som hos *C. duplana*.


Cydia indivisa (Danil.)



Norwegica:Tele-
Mark; Lifjell/Bø
18.6.1976 E.Palm

13-16 mm. Imago flyver sidst i maj – først i juli i solskinnet.

Cydia indivisa (Danil.)



Larven lever overvintrene under bark på *Picea abies* og *P. sitchensis*, i harpikssår, hvor man kan se smuldet om foråret.


Cydia indivisa (Danil.)



Dania NWJ MH94
Sønder feldborg PL
XL12---V---2017
KL24---V---2017
Leg. Åge Thorup,

En klækket hun.

Cydia indivisa (Danil.)




Udbredt, men spredt og sjælden i Europa. Mangler mod vest og syd.

Cydia indivisa (Danil.)

- (Buhl *et al.*, 1983: 132): De foretrukne værtstræer har især været *Picea Abies* (Rød-Gran), men også *Picea sitchensis* (Sitka-Gran). Plantninger med angrebne træer har fortrinsvis været på en alder af 15-40 år, og træer på 20-30 år må betragtes som de bedste. En typisk lokalitet for *indivisa* er en åben og udtyndet plantning, hvor træerne har harpikssår.
- Det er bedst at søge arten på solsiden af stammerne ud mod en lysning eller en skovvej, og der er god larveaktivitet allerede fra sidst i marts og frem til først i maj. Fra angrebne harpikssår skyder tydelige ekskrementhobe frem, især langs kanterne af såret.
- Larven kan bedst lokaliseres ved at skrabe ekskrementhoben bort med en kniv og derefter følge gangen eller gangene helt ind til veddet, hvor larven oftest befinder sig.
- Det bedste tidspunkt at hjemtage larver på er sidste uge af april og den første uge af maj, da larverne i dette tidsrum er ved at være udvokset. De bliver dog let indsmurt i harpiks, fordi deres gangsystem under eftersøgningen bliver ødelagt. Larverne er kraftigt. Det sikreste er derfor at vente og så finde puppen fra omkring 6. maj til ind i juni. Måske finder man ikke mange, men til gengæld plejer de at klække uden at være parasiterede.
- Følger man larvegangen, kan man se, at larven før forpupningen har lukket gangen med en skrå klap af hvidt spind og bagved denne spundet gangen til med spind, hvori den mørkebrune puppe ligger godt beskyttet mod harpiks. (O. Buhl).

Cydia cosmophorana (Tr.)

5138




Dania NWZ:Hønsenhalsen/Tuse Næs
21.6.1979 E.Palm

8-14 mm. Imago flyver i solskin om eftermiddagen omkring fyr fra sidst i april til juni (august). Larven lever u. skadet bark af *Pinus sylvestris*, somme tider i gamle galler af *resinella* eller *Dioryctria*. Udbredt, men temmelig sjælden i det meste af Europa.

Cydia strobilella (L.)

5139



Dania NWZ:Skelle-
bj. Vænge e.la.26.2.
1984, kl. 19.3.1984
Picea E.Palm

11-15 mm. Imago i april-maj. Arten flyver i solskin i trætop-
pene.

Cydia strobilella (L.)



Larven lever i grankogler. Der er ofte larver i flere år i de samme kogler. Arten er meget ujævnt fordelt. Somme steder findes den i massevis, andre steder er den sjælden. Man skal bare samle rødgranskogler ind. Udbredt i det meste af Europa.


Cydia pactolana (Zell.)



Dania SZ: Sorø;
Lyng Huse
3.6.1982 E.Palm

12-17 mm. Imago flyver i maj-først i juli i solskin omkring *Picea* og *Abies*.
Larven overvintrer (fuldvoksen) fra juli i 2-3 år gamle skud.

Cydia pactolana (Zell.)



DANIA, SJ, MG90
Råbjerg Plt.
1.6.2016 E.Palm

Tegningerne kan være grovere og hvidlige.
Spejlet med flere sorte pletter. Den hvide plet
i frynserne kan gå helt ud eller stoppe inden frynseranden
Udbredt, men ikke almindelig i Europa.



Cydia pactolana og grunertiana




Cydia pactolana. Vingetegningerne er sammenhængende. En lille, hvid plet går gennem frynserne ikke så langt fra vingspidsen. Rodfeltet ensfarvet.

Disse to arter var tidligere sammenblandet.



Cydia grunertiana. Vingetegningerne delvist opløst i pletter. Ingen hvid plet gennem frynserne nær vingspidsen. Rodfeltet spraglet udadtil.


Cydia grunertiana (Ratz.)



Dania NEZ:Hille-
Rød e.la.6.4.98,kl.
26.4.1998 E.Palm
Larex europaea

12-16 mm. Imago i maj—juni omkring Europæisk Lærk. Larven lever overvintrene i barken, hvor den laver tydelige store, rødbrune ekskrementudskud. Den æder også efter overvintringen og pupper i maj.


Cydia grunertiana (Ratz.)



Arten er udbredt i Mellem Europa. Danmark/Skåne er nordgrænsen. Men den er relativt nyopdaget og udskilt fra *C. pactolana* og derfor måske mere udbredt end litteraturen angiver. Måske er den reelt nyindvandret. I Nordeuropa kun kendt fra Danmark og Sverige (Skåne og Halland).

Cydia milleniana (Adamz.)

5142



11.23.4.1914
Linnéa-D.
Händer

11-18 mm. Imago formentlig i juni-juli. Larven lever på lærk i to-årige skud, som svulmer op til en somme tider ganske stor galle. Den overvintrer. Mellemeuropa. Meget lidet kendt. I DK kun ét eks. Klækket i Brandenburg 2003.

Cydia zebeana (Sax.)


5243



Dania: SZ: Fed
e.l.23.4.1998, kl.9.5.
Larex europaea E. Palm

14-18 mm. Imago i maj-juni. Larven lever i barksår på *Larix europaea* (europæisk lærk) fra september til maj.

Cydia zebeana (Sax.)



Meget lidt kendt, men fundet i det centrale Europa.

Et ældre fund i Niedersachsen, ellers kun mod syd i Tyskland. Klækket fra Brandenburg 2003. Ikke i øvrigt i Skandinavien.

Cydia pomonella (L.)

Æblevikleren


5144



Dania: NWZ:Eske-
bjerg Vesterlyng
3.7.2010 E.Palm

14-22 mm. Imago i maj-juni og juli-august. Den kommer til lys.
Larven er den kendte "orm" i æbler. Den er et skadedyr.

Cydia pomonella (L.)




DANIA, SJ, MF89
Sdr. Sejerslev
24.6.2017 E.Palm

Kendes fra alle lande i Europa.

Cydia servillana (Dup.)

5146



Dania NWZ:
Kongsøre Skov
6.6.1980 E.Palm


13-16 mm. Imago flyver i solskin sidst på dagen over pilene i juni.

Cydia servillana (Dup.)



Larven lever på *Salix caprea* og *Salix cinerea* og forårsager en svag opsvulmning af kvisten som kan findes i det tidlige forår (inden pileraklerne springer ud). Det er dog kun i kviste, der er for tynde, der dannes en galle. Foto: Niels Lykke.

Cydia servillana (Dup.)




Udbredt i det meste af Europa, men sjældent de fleste steder. Nordgrænsen går gennem det sydligste Norge og Finland. I Sverige har man i de senere år fundet arten mange steder på feromon. Arten er sikkert i virkeligheden mere almindelig, men meget lidt flyvende og ikke så repræsenteret i samlingerne.

Cydia triangulella (Goeze)

(*splendana* Hb.)

5152



Dania: SJ, MF89
Sdr. Sejerslev
4.8.2015 E.Palm

11-19 mm. Imago sidst i juni-juli. Den kommer fint til lys og kan bankes ud af vegetationen sidst på dagen.


Cydia triangulella (Goeze)



Dania:LFM: Maltrup
Skov 2.8.1993
E. Palm leg.

Arten har to former. Ovenstående er den mørke form.


Cydia triangulella (Goeze)



France, 66 Pyrénées-
Orientales; Llauro
6.9.2014 E.Palm

Arten kan blive meget spraglet. Larven lever overvintrene i agern (sammen med *C. amplana*). Udbredt og almindelig i hele Europa. Mange steder mod syd den almindeligste vikler.


Cydia fagiglandana (Z.)



DANIA, SJ, MF89
Sdr. Sejerslev
21.7.2012 E.Palm

11-19 mm. Imago flyver sidst i juni-juli (august-september).
Den kommer fint til lys og kan bankes ud om dagen.

Cydia fagiglandana (Z.)



Dania SJ: Als
Sønderskov
23.6.1981 E.Palm



Larven lever i frugterne af bøg (somme tider også eg).
Den overvintrer i jorden. Europa, undtagen mod (nord)øst.

Cydia amplana (Hb.)



Dania: LFM: Møns
Klint (v. fyret)
21.7.2010 E.Palm

16-20 mm. Imago i juni-august. Arten flyver omkring eg i dagtimerne og kommer villigt til lys.

Cydia amplana (Hb.)



DANIA, SJ, MF89
Sdr. Sejerslev
5.8.2013 E.Palm

I Danmark er der ikke megen variation,
men længere mod syd kan den blive
langt lysere og mærket meget sløret.


Cydia amplana (Hb.)

Larven overvintrer og lever i agern,
Men forlader nødderne når de
falder til jorden. Når agerne er
faldet til jorden er der ca. 14 dage
til at samle dem op, inden larverne
forlader dem.

På billedet: En pose blandede
bolsjer! Agern inficeret med både
Cydia triangulana og *C. amplana*.
C. triangulana larven er hvid, *C.*
amplana larven er murstensrød.




Cydia amplana (Hb.)



Rimelig nyindvandret (indtil 2004 kun kendt i 4 fund), og stadig i udbredelse i DK. Kendt i nyere tid også fra Sverige og Norge (første gang i 2010 i AAY), men mangler i øvrigt stadig mod nord i Europa.

Cydia molybdana (Const.)



Italia: Genova
Pegli 26.8.2009
E. Palm

15-18 mm. Imago kommer til lys fra sidst i august - september.
Tidligere (og til dels stadig) opfattet som en form af *C. amplana*.
Larven lever i agern.

Cydia inquinatana (Hb.)



DANIA, NWZ, PG47
Løgtved Plt. e.la.
19.9.2011, kl.
23.4.2012 E.Palm
Acer platanoides

11-14 mm. Imago flyver i maj-juni i toppen af Spids-løn.


Cydia inquinatana (Hb.)



Larven lever i frugterne af *Acer pseudo-platanus* og overvintrer. Den kræver at frugterne bliver siddende i par, så den kan gå fra den ene til den anden. En vis procent overvintrer to gange som larve.



Cydia inquinatana (Hb.)



Udbredt i Europa, men mangler stadig i mange lande. Kendt fra alle lande i Nordeuropa.


Lathronympha strigana



DANIA, WJ, MG77
Nørholm Hede la.
10.5.2016, kl. 22.5.
16 E.Palm *Pericum*

11-17 mm. Imago flyver gerne om eftermiddagen omkring perikon.
Den kommer også enkeltvist til lys.

Lathronympha strigana



DANIA, SJ, MF79
Tingdal Plt. e.la.
14.5.2016, kl. 31.5.
16 E.Palm *Hypericum*

Larven lever om foråret i spundne blade af *Hypericum* (Pericon). Den er fremme lige så snart bladene kommer op af jorden.



Der er stor variation også i farven og arten kan dermed forveksles med *Eucosma*-arterne. Men den er mere ensfarvet og har ofte nogle lidt mørkere længdelinjer (som disse to afbildede eksemplarer mangler).

Arten er almindelig, somme steder meget almindelig i hele Europa.